

盤古蟾蜍 特

Bufo bankorensis Barbour, 1908

海拔：1 - 2603公尺

筆數：1273筆 (2.9%)

數量：2871隻次 (1.9%)

樣點：278個 (11.8%)

網格：93個 (39.57%)

月數：12個月 (100%)

天數：248天 (68.9%)

次數：594次 (13.4%)

縣市：15個 (71.4%)


鄉鎮：79個 (32.2%)

團隊：51個 (66.2%)

志工：337位 (60.3%)





1



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40 Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

黑眶蟾蜍

Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799)

海拔：0 - 1042公尺

筆數：4072筆 (9.3%)

數量：13973隻次 (9%)

樣點：740個 (31.4%)

網格：144個 (61.28%)

月數：12個月 (100%)

天數：297天 (82.5%)

次數：1475次 (33.3%)

縣市：21個 (100%)


鄉鎮：154個 (62.9%)

團隊：66個 (85.7%)

志工：442位 (79.1%)





2



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12

中國樹蟾

Hyla chinensis Günther, 1858

海拔：0 - 1227公尺

筆數：705筆 (1.6%)

數量：2706隻次 (1.7%)

樣點：111個 (4.7%)

網格：53個 (22.55%)

月數：12個月 (100%)

天數：138天 (38.3%)

次數：261次 (5.9%)

縣市：16個 (76.2%)


鄉鎮：54個 (22%)

團隊：34個 (44.2%)

志工：152位 (27.2%)





3



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

小雨蛙

Microhyla fissipes Boulenger, 1884

海拔：0 - 1227公尺

筆數：2108筆 (4.8%)

數量：10457隻次 (6.7%)

樣點：576個 (24.5%)

網格：138個 (58.72%)

月數：12個月 (100%)

天數：266天 (73.9%)

次數：1172次 (26.5%)

縣市：20個 (95.2%)


鄉鎮：144個 (58.8%)

團隊：63個 (81.8%)

志工：389位 (69.6%)





4



2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12

黑蒙西氏小雨蛙

Microhyla heymonsi Vogt, 1911

海拔：23 - 1066公尺

筆數：604筆 (1.4%)

數量：2820隻次 (1.8%)

樣點：174個 (7.4%)

網格：64個 (27.23%)

月數：12個月 (100%)

天數：126天 (35%)

次數：299次 (6.8%)

縣市：11個 (52.4%)


鄉鎮：52個 (21.2%)

團隊：31個 (40.3%)

志工：161位 (28.8%)





5



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

巴氏小雨蛙

Microhyla butleri Boulenger, 1900

海拔：51 - 656公尺

筆數：54筆 (0.1%)

數量：347隻次 (0.2%)

樣點：14個 (0.6%)

網格：10個 (4.26%)

月數：9個月 (75%)

天數：19天 (5.3%)

次數：26次 (0.6%)

縣市：4個 (19%)


鄉鎮：9個 (3.7%)

團隊：9個 (11.7%)

志工：25位 (4.5%)





6



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

史丹吉氏小雨蛙

Micryletta steinegeri (Boulenger, 1909)

海拔：4 - 509公尺

筆數：187筆 (0.4%)

數量：1136隻次 (0.7%)

樣點：43個 (1.8%)

網格：20個 (8.51%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：58天 (16.1%)

次數：100次 (2.3%)

縣市：9個 (42.9%)


鄉鎮：20個 (8.2%)

團隊：16個 (20.8%)

志工：60位 (10.7%)





7



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

亞洲錦蛙 外

Kaloula pulchra pulchra Gray, 1831

海拔：1 - 321公尺

筆數：244筆 (0.6%)

數量：716隻次 (0.5%)

樣點：71個 (3%)

網格：25個 (10.64%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：78天 (21.7%)

次數：126次 (2.8%)

縣市：10個 (47.6%)


鄉鎮：27個 (11%)

團隊：20個 (26%)

志工：71位 (12.7%)





8



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

貢德氏赤蛙

Sylvirana guentheri (Boulenger, 1882)

海拔：0 - 1013公尺

筆數：2121筆 (4.8%)

數量：6237隻次 (4%)

樣點：567個 (24.1%)

網格：130個 (55.32%)

月數：12個月 (100%)

天數：240天 (66.7%)

次數：1062次 (24%)

縣市：20個 (95.2%)


鄉鎮：142個 (58%)

團隊：65個 (84.4%)

志工：419位 (75%)





9



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖 & 海拔
(2007 ~ 2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

拉都希氏赤蛙

Hylarana latouchii (Boulenger, 1899)

海拔：0 - 1307公尺

筆數：4594筆 (10.4%)

數量：14696隻次 (9.5%)

樣點：599個 (25.4%)

網格：153個 (65.11%)

月數：12個月 (100%)

天數：339天 (94.2%)

次數：1504次 (34%)

縣市：19個 (90.5%)


鄉鎮：133個 (54.3%)

團隊：67個 (87%)

志工：459位 (82.1%)





10



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12

腹斑蛙

Nidirana adenopleura (Boulenger, 1909)

海拔：5 - 2093公尺

筆數：1302筆 (3%)

數量：4860隻次 (3.1%)

樣點：234個 (9.9%)

網格：78個 (33.19%)

月數：12個月 (100%)

天數：235天 (65.3%)

次數：573次 (12.9%)

縣市：13個 (61.9%)


鄉鎮：69個 (28.2%)

團隊：40個 (51.9%)

志工：252位 (45.1%)





11



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40 Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12

豎琴蛙 保

Nidirana okinavana (Boettger, 1895)

海拔：641 - 813公尺

筆數：18筆 (0.04%)

數量：101隻次 (0.07%)

樣點：10個 (0.4%)

網格：2個 (0.85%)

月數：5個月 (41.7%)

天數：9天 (2.5%)

次數：12次 (0.3%)

縣市：1個 (4.8%)


鄉鎮：1個 (0.4%)

團隊：7個 (9.1%)

志工：16位 (2.9%)





12



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

長腳赤蛙

特

Rana longicrus Stejneger, 1898

海拔：0 - 820公尺

筆數：391筆 (0.9%)

數量：719隻次 (0.5%)

樣點：93個 (3.9%)

網格：34個 (14.47%)

月數：12個月 (100%)

天數：106天 (29.4%)

次數：166次 (3.7%)

縣市：8個 (38.1%)


鄉鎮：38個 (15.5%)

團隊：30個 (39%)

志工：159位 (28.4%)





13



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

梭德氏赤蛙 特

Rana sauteri Boulenger, 1909

海拔：86 - 2299公尺

筆數：213筆 (0.5%)

數量：6269隻次 (4.0%)

樣點：45個 (1.9%)

網格：27個 (11.49%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：45天 (12.5%)

次數：71次 (1.6%)

縣市：9個 (42.9%)


鄉鎮：26個 (10.6%)

團隊：20個 (26%)

志工：84位 (15%)





14



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40 Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

金線蛙

保

15

Pelophylax fukienensis (Pope, 1929)

海拔：5 - 578公尺

筆數：188筆 (0.4%)

數量：1348隻次 (0.9%)

樣點：20個 (0.8%)

網格：11個 (4.68%)

月數：12個月 (100%)

天數：48天 (13.3%)


次數：72次 (1.6%)

縣市：7個 (33.3%)

鄉鎮：9個 (3.7%)

團隊：12個 (15.6%)

志工：59位 (10.6%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

臺北赤蛙 保

Hylarana taipehensis (Van Denburgh, 1909)

海拔：13 - 246公尺

筆數：42筆 (0.1%)

數量：161隻次 (0.1%)

樣點：14個 (0.6%)

網格：4個 (1.7%)

月數：4個月 (33.3%)

天數：12天 (3.3%)

次數：18次 (0.4%)

縣市：4個 (19%)


鄉鎮：5個 (2%)

團隊：11個 (14.3%)

志工：26位 (4.7%)



16




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

斯文豪氏赤蛙 特

Odorrana swinhoana (Boulenger, 1903)

海拔：4 - 1933公尺

筆數：1414筆 (3.2%)

數量：3638隻次 (2.3%)

樣點：251個 (10.7%)

網格：88個 (37.45%)

月數：12個月 (100%)

天數：249天 (69.2%)

次數：564次 (12.7%)

縣市：15個 (71.4%)


鄉鎮：74個 (30.2%)

團隊：48個 (62.3%)

志工：319位 (57.1%)





17



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

美洲牛蛙 外

Aquarana catesbeiana (Shaw, 1802)

海拔：36 - 455公尺

筆數：11筆 (0.02%)

數量：11隻次 (0.01%)

樣點：7個 (0.3%)

網格：5個 (2.13%)

月數：7個月 (58.3%)

天數：8天 (2.2%)

次數：9次 (0.2%)

縣市：4個 (19%)


鄉鎮：5個 (2%)

團隊：6個 (7.8%)

志工：10位 (1.8%)





18



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

澤蛙

Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829)

海拔：0 - 1209公尺

筆數：5107筆 (11.6%)

數量：16241隻次 (10.5%)

樣點：1224個 (52%)

網格：170個 (72.34%)

月數：12個月 (100%)

天數：314天 (87.2%)

次數：2071次 (46.8%)

縣市：20個 (95.2%)


鄉鎮：184個 (75.1%)

團隊：67個 (87%)

志工：477位 (85.3%)





19



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

海蛙 外

Fejervarya cancrivora (Gravenhorst, 1829)

海拔：2 - 9公尺

筆數：16筆 (0.04%)

數量：53隻次 (0.03%)

樣點：8個 (0.3%)

網格：4個 (1.7%)

月數：5個月 (41.7%)

天數：7天 (1.9%)

次數：9次 (0.2%)

縣市：3個 (14.3%)

鄉鎮：3個 (1.2%)

團隊：6個 (7.8%)

志工：14位 (2.5%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12

虎皮蛙

Hoplobatrachus chinensis (Osbeck, 1765)

海拔：0 - 683公尺

筆數：350筆 (0.8%)

數量：636隻次 (0.4%)

樣點：155個 (6.6%)

網格：75個 (31.91%)

月數：12個月 (100%)

天數：138天 (38.3%)

次數：239次 (5.4%)

縣市：17個 (81%)

鄉鎮：75個 (30.6%)

團隊：42個 (54.5%)

志工：220位 (39.4%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12

福建大頭蛙

Limnonectes fujianensis Ye and Fei, 1994

海拔：8 - 1066公尺

筆數：1112筆 (2.5%)

數量：2339隻次 (1.5%)

樣點：187個 (7.9%)

網格：64個 (27.23%)

月數：12個月 (100%)

天數：247天 (68.6%)

次數：527次 (11.9%)

縣市：11個 (52.4%)


鄉鎮：67個 (27.3%)

團隊：42個 (54.5%)

志工：243位 (43.5%)





22



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12

褐樹蛙

特

23

Buergeria robusta (Boulenger, 1909)

海拔：7 - 1297公尺

筆數：681筆 (1.5%)

數量：2381隻次 (1.5%)

樣點：175個 (7.4%)

網格：82個 (34.89%)

月數：12個月 (100%)

天數：180天 (50%)


次數：336次 (7.6%)

縣市：14個 (66.7%)

鄉鎮：71個 (29%)

團隊：39個 (50.6%)

志工：246位 (44%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

周氏樹蛙

Buergeria choui Matsui and Tominaga, 2020

海拔：7 - 1141公尺

筆數：810筆 (1.8%)

數量：6322隻次 (4.1%)

樣點：158個 (6.7%)

網格：50個 (21.28%)

月數：12個月 (100%)

天數：150天 (41.7%)

次數：318次 (7.2%)

縣市：10個 (47.6%)


鄉鎮：46個 (18.8%)

團隊：30個 (39%)

志工：164位 (29.3%)





24



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40 Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

太田樹蛙 特

Buergeria otai Wang, Hsiao, Lee, Tseng, Lin, Komaki, and Lin, 2018 "2017"

海拔：4 - 996公尺

筆數：832筆 (1.9%)

數量：3646隻次 (2.3%)

樣點：120個 (5.1%)

網格：48個 (20.43%)

月數：12個月 (100%)

天數：152天 (42.2%)

次數：265次 (6%)

縣市：7個 (33.3%)


鄉鎮：35個 (14.3%)

團隊：22個 (28.6%)

志工：144位 (25.8%)





25



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

面天樹蛙

特

Kurixalus idiootocus (Kuramoto and Wang, 1987)

海拔：0 - 1209公尺

筆數：2899筆 (6.6%)

數量：11290隻次 (7.3%)

樣點：414個 (17.6%)

網格：98個 (41.7%)

月數：12個月 (100%)

天數：290天 (80.6%)

次數：1088次 (24.6%)

縣市：15個 (71.4%)


鄉鎮：97個 (39.6%)

團隊：51個 (66.2%)

志工：303位 (54.2%)





26



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

艾氏樹蛙

Kurixalus eiffingeri (Boettger, 1895)

海拔：12 - 2273公尺

筆數：626筆 (1.4%)

數量：2208隻次 (1.4%)

樣點：184個 (7.8%)

網格：63個 (26.81%)

月數：12個月 (100%)

天數：165天 (45.8%)

次數：343次 (7.7%)

縣市：13個 (61.9%)


鄉鎮：53個 (21.6%)

團隊：36個 (46.8%)

志工：203位 (36.3%)




27




2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



請留意！左側歷年分布圖資料
包含2015年以前尚未分類出
王氏樹蛙與碧眼樹蛙的分布資料



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

碧眼樹蛙 特

28

Kurixalus berylliniris Wu, Huang, Tsai, Li, Jhang, and Wu, 2016

海拔：77 - 1026公尺

筆數：123筆 (0.3%)

數量：305隻次 (0.2%)

樣點：18個 (0.8%)

網格：9個 (3.83%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：28天 (7.8%)


次數：34次 (0.8%)

縣市：2個 (9.5%)

鄉鎮：9個 (3.7%)

團隊：12個 (15.6%)



志工：43位 (7.7%)



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

王氏樹蛙 特

29

Kurixalus wangi Wu, Huang, Tsai, Li, Jhang, and Wu, 2016

海拔：44 - 726公尺

筆數：93筆 (0.2%)

數量：332隻次 (0.2%)

樣點：30個 (1.3%)

網格：7個 (2.98%)

月數：10個月 (83.3%)

天數：26天 (7.2%)


次數：47次 (1.1%)

縣市：2個 (9.5%)

鄉鎮：5個 (2%)

團隊：10個 (13%)

志工：57位 (10.2%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

布氏樹蛙

Polypedates braueri (Vogt, 1911)

海拔：1 - 1290公尺

筆數：957筆 (2.2%)

數量：2210隻次 (1.4%)

樣點：259個 (11%)

網格：107個 (45.53%)

月數：12個月 (100%)

天數：187天 (51.9%)

次數：501次 (11.3%)

縣市：17個 (81%)


鄉鎮：90個 (36.7%)

團隊：45個 (58.4%)

志工：254位 (45.4%)





30



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

斑腿樹蛙 (外)

Polypedates megacephalus (Hallowell, 1861)

海拔：0 - 1096公尺

筆數：7041筆 (16%)

數量：19896隻次 (12.8%)

樣點：1017個 (43.2%)

網格：129個 (54.89%)

月數：12個月 (100%)

天數：320天 (88.9%)

次數：1843次 (41.6%)

縣市：19個 (90.5%)


鄉鎮：169個 (69%)

團隊：63個 (81.8%)

志工：431位 (77.1%)





31



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

諸羅樹蛙

特 保

Zhangixalus arvalis (Lue, Lai, and Chen, 1995)

海拔：4 - 125公尺

筆數：147筆 (0.3%)

數量：1122隻次 (0.7%)

樣點：30個 (1.3%)

網格：8個 (3.4%)

月數：6個月 (50%)

天數：39天 (10.8%)

次數：80次 (1.8%)

縣市：4個 (19%)


鄉鎮：12個 (4.9%)

團隊：13個 (16.9%)

志工：52位 (9.3%)





32



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40 Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

橙腹樹蛙

特 保

33

Zhangixalus aurantiventris (Lue, Lai, and Chen, 1994)

海拔：496 - 1166公尺

筆數：36筆 (0.08%)

數量：68隻次 (0.04%)

樣點：13個 (0.6%)

網格：6個 (2.55%)

月數：8個月 (66.7%)

天數：17天 (4.7%)


次數：18次 (0.4%)

縣市：5個 (23.8%)

鄉鎮：6個 (2.4%)

團隊：8個 (10.4%)

志工：28位 (5%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m


橙腹樹蛙



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

莫氏樹蛙

特

Zhangixalus moltrechti (Boulenger, 1908)

海拔：5 - 2471公尺

筆數：1266筆 (2.9%)

數量：2921隻次 (1.9%)

樣點：249個 (10.6%)

網格：92個 (39.15%)

月數：12個月 (100%)

天數：217天 (60.3%)

次數：512次 (11.6%)

縣市：15個 (71.4%)


鄉鎮：70個 (28.6%)

團隊：42個 (54.5%)

志工：269位 (48.1%)





34



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40 Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

翡翠樹蛙

特

保

Zhangixalus prasinatus (Mou, Risch, and Lue, 1983)

海拔：19 - 925公尺

筆數：457筆 (1.0%)

數量：1030隻次 (0.7%)

樣點：64個 (2.7%)

網格：17個 (7.23%)

月數：12個月 (100%)

天數：135天 (37.5%)

次數：184次 (4.2%)

縣市：5個 (23.8%)


鄉鎮：19個 (7.8%)

團隊：22個 (28.6%)

志工：105位 (18.8%)





35



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

臺北樹蛙

特 保

Zhangixalus taipeianus (Liang and Wang, 1978)

海拔：4 - 873公尺

筆數：574筆 (1.3%)

數量：1770隻次 (1.1%)

樣點：126個 (5.4%)

網格：38個 (16.17%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：124天 (34.4%)

次數：258次 (5.8%)

縣市：9個 (42.9%)


鄉鎮：43個 (17.6%)

團隊：32個 (41.6%)

志工：171位 (30.6%)





36



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40 Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12

溫室蟾 外

Eleutherodactylus planirostris (Cope, 1862)

海拔：14 - 116公尺

筆數：134筆 (0.3%)

數量：1554隻次 (1.0%)

樣點：18個 (0.8%)

網格：3個 (1.28%)

月數：8個月 (66.7%)

天數：25天 (6.9%)

次數：32次 (0.7%)

縣市：2個 (9.5%)


鄉鎮：5個 (2%)

團隊：12個 (15.6%)

志工：47位 (8.4%)





37



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

0 20 40
Km

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11

資料下載：2023.11.12

海蟾蜍 外

Rhinella marina (Linnaeus, 1758)

海拔：93 - 162公尺

筆數：944筆 (2.1%)

數量：5771隻次 (3.7%)

樣點：403個 (17.1%)

網格：2個 (0.85%)

月數：12個月 (100%)

天數：187天 (51.9%)

次數：418次 (9.4%)

縣市：2個 (9.5%)


鄉鎮：2個 (0.8%)

團隊：10個 (13%)

志工：44位 (7.9%)





38



2023年各月觀察數量 ↑

2023年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007~2023) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫
調查日期：2022.11.07 ~ 2023.11.11
資料下載：2023.11.12